



## Epreuve de Mathématiques A

Durée 4 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

---

**L'usage de calculatrices est interdit.**

### AVERTISSEMENT

La **présentation**, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la **rédaction**, la **clarté et la précision** des raisonnements entreront pour une **part importante** dans l'**appréciation des copies**. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. **Les questions non correctement référencées ne seront pas notées.** Les candidats sont invités à encadrer les résultats de leurs calculs.

### CONSIGNES :

- Composer lisiblement sur les copies avec un stylo à bille à encre foncée : bleue ou noire.
- L'usage de stylo à friction, stylo plume, stylo feutre, liquide de correction et dérouleur de ruban correcteur est strictement interdit. Les surveillants et surveillantes se réservent le droit de les confisquer.
- Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : nom, prénom, numéro inscription, date de naissance, le libellé du concours, le libellé de l'épreuve et la session.
- Une feuille, dont l'entête n'a pas été intégralement renseigné, ne sera pas prise en compte.
- Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance. La présence d'une information d'identification en dehors du cartouche donnera lieu à un point de pénalité et la page concernée pourra être soustraite de la correction.

**Tournez la page S.V.P**

## Exercice 1

Cet exercice comporte trois parties. Les parties 2 et 3 sont indépendantes et utilisent toutes les deux des résultats de la partie 1.

On définit  $\varphi$  sur  $\mathbb{R}[X]$  par

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \quad \varphi(P) = ((X^2 - 1)P')',$$

c'est-à-dire que  $\varphi(P)$  est le polynôme dérivé du polynôme  $(X^2 - 1)P'$ .

### Préliminaire

- (a) Montrer que  $\varphi$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}[X]$ .
- (b) Calculer  $\varphi(X^n)$  pour  $n \in \mathbb{N}$ . On pourra traiter séparément le cas  $n = 0$ .

### Partie 1 : Polynômes de Legendre

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose

$$U_n(X) = (X^2 - 1)^n \quad \text{et} \quad P_n(X) = U_n^{(n)}(X).$$

On rappelle que si  $P \in \mathbb{R}[X]$  et  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $P^{(n)}$  la dérivée  $n$ -ème du polynôme  $P$ . On remarque que  $U_0(X) = P_0(X) = 1$ .

- Calculer  $P_1$  et  $P_2$ .
- Déterminer le degré de  $U_n$  puis celui de  $P_n$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .
- On fixe  $n \in \mathbb{N}$ .

(a) Vérifier que

$$(X^2 - 1)U_n' = 2nXU_n. \tag{E}$$

- (b) Rappeler la formule de Leibniz exprimant la dérivée  $p$ -ème d'un produit de deux polynômes, pour  $p \in \mathbb{N}$ .
- (c) En dérivant  $n + 1$  fois l'égalité (E), montrer que :

$$\varphi(P_n) = n(n + 1)P_n.$$

On pourra utiliser cette égalité dans les parties suivantes.

### Partie 2 : Etude d'un endomorphisme induit

Dans cette question, on fixe un entier naturel non nul  $N$ .

- Montrer que  $\mathbb{R}_N[X]$  est stable par  $\varphi$ .

On note alors  $\varphi_N$  l'endomorphisme induit par  $\varphi$  sur  $\mathbb{R}_N[X]$ . Autrement dit

$$\varphi_N : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_N[X] & \rightarrow & \mathbb{R}_N[X] \\ P & \mapsto & \varphi(P). \end{array}$$

- Ecrire la matrice  $M_N$  représentative de  $\varphi_N$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}_N[X]$ . Quelle est la taille de cette matrice ?
- Déterminer les valeurs propres de  $\varphi_N$ . Cet endomorphisme est-il diagonalisable ?
- En utilisant la partie précédente, déterminer les sous-espaces propres de  $\varphi_N$ .
- Déterminer l'ensemble des valeurs propres de  $\varphi$ .

### Partie 3 : Etude d'un produit scalaire

Dans la suite on confond polynôme et fonction polynomiale et on munit  $\mathbb{R}[X]$  du produit scalaire

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t) dt.$$

On note  $\|\cdot\|$  la norme associée à ce produit scalaire.

On rappelle que les suites de polynômes  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ont été définies dans la partie 1. Dans la suite, on pourra utiliser les résultats prouvés dans cette partie.

On cherche une suite de polynômes  $(Q_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telle que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $(Q_0, \dots, Q_n)$  soit une base orthonormée de  $\mathbb{R}_n[X]$  pour ce produit scalaire.

10. Vérifier que  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  définit bien un produit scalaire sur  $\mathbb{R}[X]$ .
11. (a) Montrer que pour tout  $(n, m) \in \mathbb{N}^2$ ,  $\langle \varphi(P_n), P_m \rangle = \langle P_n, \varphi(P_m) \rangle$ . On pourra effectuer une intégration par parties.  
(b) En déduire que  $\langle P_n, P_m \rangle = 0$  pour tout  $(n, m) \in \mathbb{N}^2$ ,  $n \neq m$ .
12. Calcul de  $\|P_n\|$ . Dans cette question, on fixe  $n \in \mathbb{N}$ .  
(a) Donner les racines de  $U_n$  ainsi que leur ordre de multiplicité.  
(b) Montrer que  $\|P_n\|^2 = (-1)^n \langle U_n^{(2n)}, U_n \rangle$ .  
(c) Calculer  $U_n^{(2n)}$ . On pourra commencer par calculer son degré.  
(d) On admet que

$$\int_{-1}^1 U_n(t) dt = \int_{-1}^1 (t^2 - 1)^n dt = (-1)^n \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{(2n+1)!}.$$

Déduire des résultats précédents la valeur de  $\|P_n\|$ .

13. Donner une suite  $(Q_n)_{n \in \mathbb{N}}$  solution du problème introduit au début de cette partie.

### Exercice 2

Cet exercice comporte quatre parties qui sont en grande partie indépendantes. Les notions et variables étudiées dans la partie 1 sont utilisées dans les parties suivantes.

Un groupe de  $n \geq 3$  amis parie sur l'issue d'un match opposant deux équipes de rugby : l'équipe  $A$  et l'équipe  $B$ . On fait les hypothèses suivantes :

- Chaque équipe a une probabilité  $\frac{1}{2}$  de gagner le match.
- Le match n'est pas truqué : son issue est indépendante des paris des joueurs.
- Chaque joueur parie 1 euro.
- Chaque joueur effectue son pari indépendamment des autres joueurs.
- Un joueur est déclaré gagnant s'il a parié sur la bonne issue du match.
- L'ensemble des gagnants se partage équitablement la mise totale de  $n$  euros.
- S'il n'y a aucun gagnant, la mise totale de  $n$  euros est reversée au club de rugby local.

Dans l'ensemble de l'exercice, on appelle gain d'un joueur la somme qu'il reçoit à l'issue du match. Ce gain ne prend pas en compte la somme qui a été mise. Ainsi s'il y a  $m \geq 1$  joueurs gagnants, le gain de chacun de ces joueurs est de  $\frac{n}{m}$ .

## Partie 1 : calcul de l'espérance du gain pour un joueur

On numérote les joueurs de 1 à  $n$  et pour tout  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , on note :

- $Y_k$  la variable qui vaut 1 si le joueur  $k$  a gagné et 0 sinon,
- $X_k$  le gain, en euros, du joueur  $k$  à l'issue du match.

Enfin, on note :

- $N = \sum_{k=1}^n Y_k$  le nombre de gagnants,
- $S = \sum_{k=1}^n X_k$  la somme des gains, en euros, des joueurs.

On admet que  $Y_k$ ,  $X_k$ ,  $N$  et  $S$  sont des variables aléatoires définies sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ .

1. Donner la loi de  $Y_k$  pour  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$  ainsi que celle de  $N$ . On explicitera les probabilités associées à ces lois.
2. Expliquer pourquoi  $S(\Omega) = \{0, n\}$  puis expliciter la loi de  $S$  et calculer  $\mathbf{E}(S)$ .
3. En déduire la valeur de  $\mathbf{E}(X_k)$  pour  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$  (le calcul de la loi de  $X_k$  n'est pas nécessaire pour cette question).
4. Un nouvel ami arrive dans le groupe, les joueurs ont-ils intérêt à ce qu'il parie avec eux ?

## Partie 2 : étude de la variable $X_k$

On fixe  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$  et on étudie la variable  $X_k$ .

5. Déterminer  $\mathbf{P}(X_k = 0)$ .
6. (a) Quelle est la loi conditionnelle de la variable  $N - 1$  sachant l'événement  $(Y_k = 1)$  ?  
(b) En déduire que pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,

$$\mathbf{P}\left(X_k = \frac{n}{i}\right) = \binom{n-1}{i-1} \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

On pourra utiliser les événements  $(X_k = \frac{n}{i})$ ,  $(Y_k = 1)$  et  $(N = i)$ .

7. Retrouver la valeur de  $\mathbf{E}(X_k)$  calculée dans la partie précédente.
8. On considère un autre joueur  $j \neq k$ . Les variables  $X_j$  et  $X_k$  sont-elles indépendantes ?

## Partie 3 : le match retour (version 1)

Après ce premier pari, le groupe d'amis se retrouve et parie sur un nouveau match entre les deux équipes. On suppose que l'issue du deuxième match est indépendante de celle du premier. Chaque joueur parie alors son gain du premier match sur le second, c'est-à-dire que le joueur  $k$  parie  $X_k$  euros.

Les gagnants se partagent alors équitablement la mise totale, c'est-à-dire  $S$  euros. On note :

- $Z_k$  le gain du joueur  $k$  lors de ce deuxième pari,
- $M$  le nombre de gagnants du deuxième pari,
- $T = \sum_{k=1}^n Z_k$  la somme des gains du deuxième pari.

On admet que  $Z_k$ ,  $M$  et  $T$  sont des variables aléatoires définies sur l'espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ .

9. (a) Donner la valeur des probabilités  $\mathbf{P}_{(S=0)}(T=0)$  et  $\mathbf{P}_{(S=n)}(T=0)$ .  
(b) En déduire que

$$\mathbf{P}(T=0) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) \quad \text{et} \quad \mathbf{P}(T=n) = \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)^2.$$

- (c) Calculer l'espérance et la variance de  $T$ .  
(d) Calculer la covariance  $\text{Cov}(S, T)$ .
10. En utilisant la variable  $T$ , calculer la valeur de  $\mathbf{E}(Z_k)$  pour  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ .  
11. Le joueur  $k$  a-t-il intérêt à parier sur ce deuxième match ?

#### Partie 4 : le match retour (version 2)

Dans cette version, seuls les joueurs ayant gagné au premier match se retrouvent pour le deuxième. Ils misent alors 1 euro. On suppose toujours que l'issue du deuxième match est indépendante de celle du premier.

Les gagnants se partagent alors équitablement la mise totale, c'est-à-dire  $N$  euros. On note :

- $W_k$  le gain du joueur  $k$  lors de ce deuxième pari, en convenant que  $W_k = 0$  pour les joueurs ayant perdu leur premier pari et ne participant donc pas au second.
- $U = \sum_{k=1}^n W_k$  la somme des gains du deuxième pari.

On admet que  $W_k$  et  $U$  sont des variables aléatoires définies sur l'espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ .

12. (a) Donner le support de la variable aléatoire  $U$ .  
(b) Soit  $(i, j) \in N(\Omega) \times U(\Omega)$ ,  $j \neq 0$ ,  $i \neq 0$ . Donner la valeur de  $\mathbf{P}_{(N=i)}(U=j)$ .  
On pourra distinguer selon que  $i = j$  ou non.  
(c) Donner la loi et l'espérance de  $U$ .
13. En déduire la valeur de  $\mathbf{E}(W_k)$ .  
14. Le joueur  $k$  a-t-il intérêt à parier sur ce deuxième match ?

Fin de l'énoncé